

Imatinib

کتابچه راهنمای مصرف ایما تینیب

شرکت نوآوران
دارویی کیمیا



این کتابچه به شما و افرادی که از شما مراقبت می کنند کمک می کند تا درباره‌ی درمان بیماری بیشتر بیاموزید.

این کتابچه شامل چه اطلاعاتی است ؟

- این کتابچه جهت پاسخ به سوالات شایع شما در مورد داروی ایماتینیب طراحی شده است، اما در نظر داشته باشید که کتابچه شامل تمام اطلاعات موجود در مورد داروی ایماتینیب نبوده و جایگزین مشاوره شما با پزشک نمی‌باشد.
- اگر شما نگرانی در مورد مصرف ایماتینیب دارید از پزشک خود سوال نمایید.
- این کتابچه را در طول دوره مصرف دارو نگهداری نمایید. ممکن است نیاز به مطالعه دوباره آن داشته باشید.

A young green plant sprout with two leaves is growing out of a patch of cracked, dry brown soil. The soil is parched and fissured, creating a stark contrast with the vibrant green of the plant. The background is a soft-focus extension of the cracked earth.

A
New
Hope
For
Cancer
Patients

موارد مصرف ایما تینیب چیست؟

ایما تینیب در درمان بزرگسالان و نیز کودکان مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن (CML) و نیز بزرگسالان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد با کروموزوم فیلادلفیا (ALL) استفاده می‌شود. این دو بیماری انواعی از لوسمی هستند که در آن یک کروموزوم معیوب آنزیمی را تولید می‌کند که باعث رشد غیر قابل کنترل گلبول‌های سفید خون می‌گردد. **ایما تینیب** گلبول‌های غیر طبیعی را از بین می‌برد و گلبول‌های سالم را دست نخورده باقی می‌گذارد.

ایما تینیب همچنین در درمان بیماریهای زیر در بزرگسالان استفاده می‌شود:

◀ بیماری های میلو دیسپلاستیک- میلوپرولیفراتیو (MDS/MPD)

- گروهی از بیماری‌های خونی هستند که در آن رشد تعدادی از سلول‌های خونی از کنترل خارج می‌گردد.

◀ ماستوسیتوز سیستمیک مهاجم (ASM)

- نوعی بدخیمی است که در آن رشد گلبول‌های قرمز اصلی که به آنها ماست سل گفته می‌شود، از کنترل خارج می‌گردد.

◀ سندرم هایپر ائوزینوفیلیک (HES) یا لوسمی ائوزینوفیلیک حاد (CEL)

- نوعی بیماری خونی است که در آن رشد برخی گلبول‌های خونی به نام ائوزینوفیل از کنترل خارج می‌شود.

◀ GIST

- نوعی بدخیمی معده و روده است. این سرطان باعث می‌شود رشد سلول‌ها و بافت‌های احاطه کننده معده و روده از کنترل خارج شود.

◀ درماتوفیبروسارکوما پروتوبرانس (DFSP)

- نوعی بدخیمی بافت زیر پوست است که در آن رشد برخی سلول‌ها از کنترل خارج می‌شود.
- ایما تینیب رشد سلول‌های غیرطبیعی را کند می‌کند. سلول‌های غیرطبیعی را از بین برده و سلول‌های طبیعی را دست نخورده باقی می‌گذارد.

موارد مصرف ایما تینیب چیست؟

اگر سوالی در مورد علت تجویز این دارو برای درمان بیماری خود دارید از پزشک معالجتان سوال نمایید.

- اطلاعات کافی در مورد مصرف این دارو در کودکان کمتر از سه سال وجود ندارد.
- مصرف ایما تینیب تنها با تجویز پزشک صورت گیرد.
- این دارو اعتیاد آور نمی باشد.

توجه:

در صورت بروز هر گونه آلرژی نسبت به ایماتینیب یا هر یک از اجزا موجود در دارو، از مصرف ایماتینیب خودداری نمایید.

برخی از علائم واکنش آلرژیک نسبت به ایماتینیب شامل مشکل در تنفس، تورم صورت، لب، زبان یا سایر قسمت‌های بدن، راش و خارش پوستی می باشد.

نکات مهم

قبل از شروع درمان با ایماتینیب

- ۱- اگر باردار هستید و یا قصد باردار شدن دارید پزشک خود را مطلع نمایید. این دارو ممکن است برای جنین مضر باشد. اگر مصرف این دارو در طی بارداری برای شما ضروری باشد پزشک در مورد فواید و مضرات مصرف این دارو شما را مطلع خواهد ساخت.
- ۲- اگر کودک شیرخوار دارید، پزشک معالج خود را مطلع نمایید. از آنجا که عدم ترشح ایماتینیب در شیر مادر ثابت نشده است و احتمال تاثیر منفی دارو بر جنین وجود دارد، توصیه می شود از شیردهی در زمان مصرف ایماتینیب خودداری نمایید.
- ۳- در صورت وجود هر یک از مشکلات پزشکی زیر، پزشک معالج خود را مطلع نمایید.
 - مشکلات کبدی یا کلیوی
 - مشکلات قلبی
 - برداشتن غده تیروئید توسط عمل جراحی

۴ - مصرف سایر داروها

در صورت مصرف داروهای دیگر از جمله داروهایی که بدون نسخه از داروخانه تهیه می شوند، پزشک خود را مطلع نمایید. ایما تینیب ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد، بخصوص داروهایی که از طریق کبد دفع می گردد مانند:

- پاراستامول، ترکیبی که در بیشتر داروهای ضد درد و داروی سرماخوردگی وجود دارد.
- آنتی بیوتیک‌ها از قبیل ریفاپمپسین، کتوکونازول، اریترومایسین، کلاریترومایسین و ایتراکونازول
- داروهای ضد ویروسی که در درمان ایدز استفاده می‌شود.
- دگزامتازون
- داروهای کاهنده کلسترول مانند سیمواستاتین
- داروهای ضد صرع از جمله فنی توئین، کاربامازپین و فنوباریتال
- وارفارین (داروی ضد انعقاد)
- برخی داروهای موثر در درمان اختلالات روانی و افسردگی
- داروهای موثر در درمان فشار خون بالا و مشکلات قلبی
- سیکلوسپورین

دوزاز و نحوه‌ی مصرف ایماتینیب

◀ ایماتینیب را با دقت و مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

• این دستورات ممکن است متفاوت با اطلاعات این کتابچه باشد.

◀ اگر اطلاعات موجود در بروشور دارو را متوجه نمی‌شوید از پزشک معالج یا دکتر داروساز سوال نمایید.

◀ دوز مصرفی ایماتینیب چه مقدار می باشد؟

- برای درمان CML دوز معمول بالغین ۴۰۰-۶۰۰ میلی گرم در روز و حداکثر ۸۰۰ میلی گرم در روز می باشد. دوز مصرفی بستگی به مرحله بیماری دارد. دوز مصرفی در کودکان متفاوت است.
- دوز درمانی ALL با کروموزوم فیلادلفیا ۶۰۰ میلی گرم در روز می باشد.
- دوز شروع درمان در MDS/MPD ۴۰۰ میلی گرم در روز می باشد.
- برای درمان ASM و HES/CEL معمولاً دوز شروع درمان ۴۰۰ میلی گرم در روز می باشد، ممکن است در برخی بیماران دوز شروع درمان ۱۰۰ میلی گرم در روز باشد.
- دوز معمول درمان در GIST ۴۰۰ یا ۶۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

- دوز شروع در درمان DFSP ۸۰۰ میلی گرم در روز می باشد.
- دوز ۴۰۰ میلی گرم باید بصورت یک قرص ۴۰۰ میلی گرم یک بار در روز استفاده شود.
- دوز ۶۰۰ میلی گرم باید بصورت یک قرص کامل و نصف قرص ۴۰۰ میلی گرم یک بار در روز و یا ۶ کپسول ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز استفاده شود.
- دوز ۸۰۰ میلی گرم باید بصورت ۴۰۰ میلی گرم دو بار در روز (صبح و شب) استفاده شود.
- ایماتینیب معمولاً بصورت دوز منفرد استفاده می شود، اگرچه ممکن است پزشک دارو را در دو دوز صبح و شب تجویز نماید.

◀ چگونه ایماتینیب را مصرف نمایید؟

- دارو را با یک لیوان بزرگ آب و یا همراه با غذا مصرف نمایید. این امر از تحریک معده و مری جلوگیری می نماید.

◀ اگر شما قادر به بلعیدن قرص یا کپسول نیستید چه باید بکنید؟

- محتویات داخل کپسول یا قرص را در یک لیوان آب و یا آب سیب بطور کامل حل کرده و فوراً همه محتویات لیوان را بنوشید (مقدار مایع لازم برای کپسول ۱۰۰ میلی گرم برابر ۵۰ میلی لیتر و برای قرص ۴۰۰ میلی گرم برابر ۲۰۰ میلی لیتر است).

برای اثر بخشی بهتر، دارو را هر روز در زمان معینی مصرف نمایید.

دوزاژ و نحوه‌ی مصرف ایماتینیب

◀ تا چه زمانی باید ایماتینیب را مصرف نمایید؟

- تا اتمام زمانی که پزشک معالج تجویز نموده، به مصرف روزانه ایماتینیب ادامه دهید.
- پزشک روند درمان شما را از نزدیک پیگیری خواهد کرد تا از اثربخش بودن درمان اطمینان حاصل نماید.

◀ در صورت فراموش نمودن مصرف ایماتینیب چه باید بکنید؟

- دوز فراموش شده را به محض یادآوری مصرف نمایید و سپس طبق برنامه قبلی درمان را ادامه دهید.
- در صورت فراموش نمودن یک دوز، از دو برابر کردن دوز بعد اجتناب نمایید، زیرا ممکن است خطر بروز عوارض جانبی دارو را افزایش دهد. اگر نمی دانید چه باید بکنید با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

◀ در صورت مصرف دوز اضافی چه باید بکنید؟

- فوراً با پزشک خود و یا مرکز اطلاعات مسمومیت تماس حاصل نمایید و یا به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنید.

HOPE

نکاتی که در طول مصرف ایماتینیب باید رعایت کنید

کارهایی را که باید در هنگام مصرف ایماتینیب انجام دهید:

- ◀ مطمئن شوید که دستورات پزشک را بدقت انجام می‌دهید.
 - برای اطمینان از اثر بخشی روش درمانی، نیاز به پیگیری منظم درمان دارید. انجام تستهای خونی منظم و کنترل وزن می‌تواند از ایجاد عوارض جلوگیری کند.
 - ◀ در خلال درمان از یک روش مطمئن جهت جلوگیری از بارداری استفاده نمایید. در صورت بارداری در زمان مصرف ایماتینیب سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.
 - ◀ در صورت مصرف داروی جدید، پزشک یا داروساز را از مصرف ایماتینیب مطلع نمایید.
- پزشک و دندانپزشک خود را حتماً از مصرف ایماتینیب مطلع نمایید.

توجه:

مصرف این دارو را به دیگران توصیه نکنید، حتی اگر به نظر برسد علائمی مشابه بیماری شما داشته باشند.

نکاتی که در طول مصرف ایماتینیب باید رعایت کنید

- ◀ مادامی که تحت درمان با ایماتینیب هستید از نوشیدن آب گریپ فروت خودداری نمایید.
- آب گریپ فروت ممکن است با ایماتینیب تداخل عمل داشته و چگونگی تاثیر این دارو را در بدن تغییر دهد.
- ◀ اگر نیاز به مصرف دارویی برای درمان سردرد، سرماخوردگی و یا دردهای خفیف دارید از مصرف داروهای حاوی پاراستامول اجتناب نمایید. از پزشک یا دکتر داروساز بخواهید تا دارویی مناسب را به شما معرفی نماید.
- ◀ تا زمانی که تاثیر ایماتینیب بر بدن شما آشکار می شود در هنگام رانندگی و یا کار با وسائلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد احتیاط نمایید.
- از آنجا که این دارو ممکن است باعث سرگیجه و یا سبکی سر در برخی افراد گردد قبل از رانندگی و یا انجام کار با وسائلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند از واکنش بدن خود به این دارو مطلع گردید.
- ◀ در مکانهای رو باز از پوشش مناسب استفاده نمایید.
- ممکن است این دارو باعث افزایش حساسیت پوست شما نسبت به حالت طبیعی در برابر نور خورشید گردد.
- قرار گرفتن در معرض نور خورشید ممکن است باعث ایجاد راش پوستی، خارش، قرمزی و یا سوختگی شدید گردد. در صورت بروز سوختگی پوستی شدید پزشک خود را مطلع نمایید.



عوارض جانبی

- ◀ هنگام مصرف ایماپتینیب در صورتی که احساس کسالت نمودید پزشک خود را مطلع نمایید.
- همه داروها ممکن است باعث بروز عوارض جانبی گردند، گاهی اوقات این عوارض جدی است و ممکن است نیاز به درمان دارویی داشته باشد، ولی در اغلب موارد اینگونه نیست.
- ◀ شما ممکن است هیچ کدام از این عوارض جانبی ذکر شده را تجربه ننمایید. از پزشک معالجتان بخواهید تا به سوالات شما در این مورد پاسخ دهد.
- ◀ در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر بطوریکه باعث نگرانی شما گردد، پزشک را مطلع نمایید.
- تورم انگشتان، پلکها، صورت یا اندام تحتانی (اگر احتباس مایع شدید بود فوراً به پزشک مراجعه نمایید).
- سوء هاضمه، دل پیچه، نفخ
- تهوع یا استفراغ

- اسهال
- یبوست
- خشکی دهان
- تورم، درد و خشکی مفاصل
- درد استخوانی
- سرگیجه، احساس سبکی سر
- خستگی، ضعف و احساس کسالت
- خواب رفتن، سردی یا لرزش انگشتان دست و پا
- مشکلات خواب، احساس اضطراب، گیجی و یا فراموشی
- تغییر در احساس مزه ها
- راش، اگزما، خارش، خشکی پوست، تیرگی و یا روشنی پوست
- علائم سوختگی مانند قرمزی، خارش، تورم و یا تاول پوستی
- قرمزی، تحریک و خارش چشم
- وز وز گوش
- تغییر در اشتها و وزن
- ریزش مو

عوارض جانبی

- تعریق شبانه
- گلو درد
- سرفه و یا علائم سرماخوردگی
- کاهش میل جنسی و یا مشکلاتی در عملکرد جنسی
- بزرگی پستان، درد نوک سینه، پرئود دردناک

STOP
CANCER



شرایط نگهداری ایما تینیب

نگهداری ◀

- دارو را تا زمان مصرف در بسته اصلی و در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.
- از قرار دادن دارو در جای مرطوب خودداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. قفسه در بسته با فاصله ۱/۵ متری از سطح زمین، محل مناسبی برای نگهداری دارو می‌باشد.





Noavaran Daroui Kimia Co.