



RISE OF THE MONARCH FOR SURVIVAL!
VERZALIB®



RISE OF THE MONARCH FOR SURVIVAL!

VERZALIB®


فهرست مطالب

۰۲	درباره دفترچه
۰۵	درباره سرطان پستان
۰۶	علائم و نشانه‌ها
۰۸	ریسک فاکتورها و دلایل ابتلا
۱۰	مراحل بیماری
۱۱	تشخیص
۱۲	درمان
۱۶	ورزالیب [®] چیست و چگونه عمل می‌کند
۱۷	آنچه قبل از مصرف ورزالیب [®] باید بدانید
۱۸	نحوه مصرف ورزالیب [®]
۲۱	نحوه نگهداری ورزالیب [®]
۲۳	عوارض جانبی ورزالیب [®]
۲۷	مدیریت عوارض جانبی
۳۸	تغذیه در طول درمان
۴۱	خودآزمایی پستان
۴۴	فهرست واژگان تخصصی
۴۶	منابع

درباره دفترچه

فهمیدن اینکه خود یا یکی از عزیزانتان به سرطان مبتلا شده‌اید می‌تواند شوکه کننده باشد. ممکن است احساس ترس، افسردگی و ناامیدی کنید، این واکنش‌ها بسیار طبیعی است اما لازم است بدانید که:

شما تنها نیستید و امروزه بسیاری از مردم دنیا توانسته‌اند با این بیماری مقابله کنند و زندگی رضایت‌بخشی داشته باشند.



You Are Not Alone

About This Booklet

ممکن است سوالات بسیاری در مورد این بیماری و روش‌های درمانی آن برای شما پیش بیاید. ما سعی کرده‌ایم اطلاعات لازم در مورد بیماریتان و همچنین نحوه مصرف دارو و راهنمایی‌های مورد نیاز شما در طول درمان را در این دفترچه به صورت خلاصه شرح دهیم. با این حال همواره می‌توانید با بخش مراقبت از بیماران در شرکت نوآوران دارویی کیمیا تماس گرفته و سوالات احتمالی خود را از ما بپرسید.

- این دفترچه جایگزین مراجعه به پزشک و ارتباط با کادر درمان نمی‌باشد.
- در انتهای این دفترچه فهرست واژگان تخصصی برای اصطلاحات به کاربرده شده وجود دارد که می‌توانید به آن مراجعه کنید.

About Breast Cancer





About Breast Cancer

درباره سرطان پستان

سرطان پستان اولین سرطان شایع در ایران در بین زنان است. تقریباً نیم تا یک درصد از سرطان‌های پستان در مردان رخ می‌دهد. سرطان پستان می‌تواند در یک یا هر دو پستان شروع شود. دانستن این نکته مهم است که بیشتر توده‌های پستان خوش‌خیم هستند. با وجود این، برخی از انواع توده‌های خوش‌خیم پستان می‌توانند خطرابتاً به سرطان پستان را در زنان افزایش دهند. سرطان پستان معمولاً در لوبول‌ها، که غدد تولیدکننده شیر هستند یا در سلول‌های مجاری که مسیرهایی برای تخلیه شیر از لوبول‌ها به نوک سینه هستند؛ شروع می‌شود. با گذشت زمان ممکن است سلول‌های سرطانی به سایر قسمت‌های بدن نیز متاستاز دهد.

علائم و نشانه‌ها

به یاد داشته باشید که علائم و نشانه‌های سرطان ممکن است مشابه علائم سایر بیماری‌ها باشد. همچنین متاسفانه بسیاری از سرطان‌ها تا زمانی که به مرحله پیشرفته نرسند علامتی ندارند. بنابراین افراد باید به طور مداوم غربالگری شوند. در ادامه به برخی از نشانه‌های سرطان پستان اشاره می‌کنیم:



Symptoms

Symptoms

■ علائم و نشانه‌های سرطان پستان

- تحريك يا فرورفتگي پوست
- درد پستان
- تورم تمام يا بخشی از پستان
- توده در ناحیه زیر بغل
- درد در نوک پستان يا برگشت نوک پستان به داخل
- ترشح از نوک پستان (غير از شير مادر)
- قرمزی، پوسته پوسته شدن يا ضخيم شدن نوک پستان يا پوست پستان

خودآزمایی پستان باید بخشی از برنامه مراقبت‌های بهداشتی ماهانه شما باشد و در صورت مشاهده تغییرات باید به پزشک مراجعه کنید. (رجوع شود به صفحه ۴۱ "خودآزمایی پستان"). اگر بالای ۴۰ سال دارید يا در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان پستان هستید، باید سالانه ماموگرافی و معاینه فيزيکی توسط پزشک انجام دهید. هر چقدر تشخيص سرطان زودتر اتفاق بیافتد شанс بیشتری برای غلبه با آن دارید.

ریسک فاکتورها و دلایل ابتلا

دلایل احتمالی متعددی باعث ابتلا به سرطان می‌شوند، اما بیشتر آنها مستقیماً باعث سرطان نمی‌شوند. ریسک فاکتورها عواملی هستند که احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند.
در این بخش به برخی از ریسک فاکتورهای شناخته شده خواهیم پرداخت.




Risk Factors & Causes

Risk Factors & Causes

■ ریسک فاکتورها و دلایل ابتلا به سرطان پستان:

- سن: سرطان پستان عمدتاً در سن ۵۰ سالگی به بعد رخ می‌دهد.
- سابقه سرطان پستان در خود فرد یا خانواده
- سابقه سرطان تخدمان در خود فرد
- شروع قاعدگی زودهنگام یا یائسگی دیرهنگام: اگر قاعدگی پیش از سن ۱۱ یا ۱۲ سالگی آغاز شود و یا یائسگی در سن ۵۵ سالگی به بالا رخ دهد، ریسک ابتلا به سرطان پستان بالاتر است.
- زمان باردار شدن: وقوع اولین بارداری در سن ۳۵ سالگی به بالا یا عدم بارداری فرد در طول عمر، ریسک ابتلا به سرطان پستان را افزایش می‌دهد.
- هورمون درمانی بعد از یائسگی
- سبک زندگی: چاقی، ورزش ناکافی و نوشیدن الکل.



Disease Stages

مراحل سرطان پستان


تشخیص دقیق مرحله بیماری، بخش مهمی از تعیین بهترین درمان برای شما است. سرطان پستان بطور کلی شامل ۴ مرحله است. پس از اینکه ابتلا به سرطان برای شما تشخیص داده شد، پزشکان سعی می‌کنند مرحله بیماری را مشخص کنند. مرحله بیماری، میزان گسترش سرطان در بدن را توصیف می‌کند.

Diagnosis

■ تشخیص سرطان پستان

تست های متعددی برای تشخیص سرطان پستان که به توضیح آنها پرداختیم وجود دارد که در ادامه به پرکاربردترین آنها اشاره می کنیم:

- روش های تصویربرداری (ماموگرافی، اولتراسوند، MRI)
- بیوپسی
- تست های ژنومیک
- تست های بیومارکر



درمان سرطان پستان

برای درمان سرطان پستان روش‌های متعددی وجود دارد که انتخاب نوع درمان به نوع و مرحله سرطان بستگی دارد. البته عواملی مانند عوارض جانبی احتمالی درمان و نیز ترجیح کلی پزشک و بیمار تعیین‌کننده هستند.



Treatment

Treatment



■ جراحی

هدف از جراحی برداشتن کامل تومور یا بخشی از آن و نیز اندام‌های درگیر تومور است. جراحی معمولاً اولین گزینه و بهترین گزینه درمان بعد از تشخیص است.

■ پرتو درمانی

پرتو درمانی یا رادیوتراپی درمانی است که از پرتوهای پرانرژی برای نابود کردن سلول‌های سرطانی و تومورها استفاده می‌کند.



پرتو درمانی برای درمان سرطان‌های گستردۀ مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. پرتو درمانی سلول‌های سرطانی را که مستقیماً در مسیر تابش اشعه هستند از بین می‌برد، البته به سلول‌های سالم در مسیر خود نیز آسیب می‌رساند. به همین دلیل نمی‌توان از آن برای درمان نواحی وسیع بدن استفاده کرد.



■ شیمی درمانی

شیمی درمانی استفاده از داروها برای از بین بدن سلول های سرطانی است. شیمی درمانی معمولا با جلوگیری از پیشرفت سرطان، طول و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان پستان را در همه مراحل بهبود می بخشد. شیمی درمانی همچنین ممکن است به سلول های سالم بدن نیز آسیب برساند اما به علت فواید آن، روش درمانی مناسب برای اغلب بیماران است.



■ ایمونوتراپی

ایمونوتراپی که درمان بیولوژیک نیز نامیده می شود، به منظور تقویت دفاع طبیعی بدن در مبارزه با سرطان طراحی شده است. ایمونوتراپی در جلوگیری از گسترش بد خیمی ها به کار می رود.

Treatment



هورمون درمانی

هورمون درمانی یک درمان موثر برای اکثر تومورهایی است که دارای تست گیرنده‌های استروژن یا پروژسترون مثبت هستند.

تارگت تراپی (درمان هدفمند)

درمان‌های هدفمند سرطان، درمان‌هایی هستند که ویژگی‌های خاص سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهند؛ مانند پروتئینی که به سلول‌های سرطانی اجازه می‌دهند به روشی سریع یا غیرطبیعی رشد کنند. درمان‌های هدفمند معمولاً کمتر از شیمی‌درمانی به سلول‌های سالم و طبیعی آسیب می‌رسانند. ورزالیب® یکی از داروهای اصلی تارگت تراپی در سرطان پستان می‌باشد.



What is VERZALIB®

ورزالیب® چیست و چگونه عمل می‌کند؟

ورزالیب® نام تجاری ابماسیکلیب است. ابماسیکلیب مهارکننده کینازهای وابسته به سیکلین ۴ و ۶ (CDK4 و CDK6) است. ورزالیب® به صورت قرص‌های روکشدار ۵۰ میلی‌گرمی، ۱۰۰ میلی‌گرمی، ۱۵۰ میلی‌گرمی و ۲۰۰ میلی‌گرمی در دسترس قرار دارد.

Tips before use

■ آنچه قبل از مصرف ورزالیب® باید بدانید

پزشک خود را در مورد تمام داروهایی که مصرف می‌کنید از جمله داروهای بدون نسخه، داروهای گیاهی و مکمل‌ها مطلع کنید. داروهای دیگر ممکن است میزان ورزالیب® در خون شما را افزایش یا کاهش دهند و بر اثربخشی و بروز عوارض دارو تاثیر بگذارند.

پیش از مصرف ورزالیب® در مورد شرایط پزشکی خود خصوصاً در موارد زیر با انکولوژیست صحبت کنید، اگر:

- تب، لرز، یا هرگونه نشانه دیگری از عفونت دارید.
- سابقه لخته شدن خون در رگ‌های خونی را دارید.
- مشکلات ریوی یا تنفسی دارید.
- مشکلات کبدی یا کلیوی دارید.

● باردار هستید یا قصد بارداری دارید. ورزالیب® ممکن است به جنین آسیب برساند.

● به نوزاد خود شیر می‌دهید یا قصد شیر دادن به نوزاد خود را دارید.



نحوه مصرف ورزالیب®

- ورزالیب® را دقیقاً مطابق توصیه پزشک معالجتان مصرف کنید.
- در صورت نیاز پزشک معالج دوز مصرفی داروی شما را تغییر خواهد داد. از قطع مصرف دارو یا تغییر دوز دارو بدون اطلاع پزشک معالجتان اجتناب کنید.
- بیماران می‌توانند این دارو را همراه با غذا مصرف نمایند ولی مصرف این دارو با معده خالی نیز امکان پذیر است.



How to Take **VERZALIB®**

How to take VERZALIB®

- قرص را به طور کامل ببلعید. از جویدن، خرد کردن یا نصف کردن قرص‌ها خودداری کنید.
در صورت شکستگی، ترک خوردن یا هرگونه آسیب قرص‌ها از مصرف آن اجتناب کنید.
- قرص ورزالیب® را هر روز تقریباً در زمان مشخص مصرف کنید.
- از مصرف همزمان ورزالیب® با کتونکونازول اجتناب کنید. در صورتی که در حین درمان با ورزالیب® از فراورده‌های دارویی حاوی کتونکونازول استفاده می‌کنید، به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
- در صورتی که مشکلات وراثتی نادر مانند عدم تحمل گالاکتوز، کمبود لاتکتاز، یا سوء جذب گلوکز-گالاکتوز دارید از مصرف ورزالیب® اجتناب کنید.
- در طول درمان با ورزالیب® از مصرف گریپ فروت و محصولات حاوی گریپ فروت اجتناب کنید. ممکن است گریپ فروت میزان ورزالیب® را در خون افزایش دهد.
- خستگی و گیجی از عوارض جانبی بسیار شایع در هنگام مصرف ورزالیب® هستند، در صورتی که به صورت غیرعادی احساس خستگی و سرگیجه دارید، هنگام رانندگی یا استفاده از ماشین آلات احتیاط کنید.

How Should We Store VERZALIB®



How Should We Store VERZALIB®

نحوه نگهداری ورزالیب®

- ورزالیب® را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- دارو را دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- قرص های روکش دار ورزالیب®، را از جعبه اصلی خود خارج نکنید.
- قرص هایی که دیگر استفاده نمی شود و یا تاریخ مصرف آن ها گذشته است را مطابق دستور العمل داروهای سایتو توکسیک حمل، نگهداری و معدهوم کنید.

عوارض جانبی ورزالیب®

هر دارو به موازات اثرات دارویی مطلوب ممکن است باعث عوارض جانبی نیز شود. لازم به ذکر است این عوارض در تمام بیماران رخ نمی‌دهد و عوارض ذکر شده شامل کلیه عوارض احتمالی نیست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص عوارض دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

ورزالیب® ممکن است موجب بروز عوارض جانبی جدی ذیل شود:

■ اسهال: در هنگام مصرف ورزالیب® اسهال عارضه شایعی می‌باشد که ممکن است در موقعي شدید شود. اسهال ممکن است باعث کم‌آبی بدن (دھیدراتاسیون) یا عفونت شود. شایع ترین زمان بروز عارضه اسهال در اولین ماه درمان با ورزالیب® است. در صورتی که در طول درمان با ورزالیب® دچار اسهال شدید، پزشک معالج خود را مطلع کنید.

VERZALIB® Side Effects

■ **تعداد پایین گلبول‌های سفید خون (نوتروپنی):** تعداد پایین گلبول‌های سفید خون در طول درمان با ورزالیب® شایع است و ممکن است باعث بروز عفونت‌های جدی شود که تهدیدکننده حیات هستند. لازم است تا پزشک معالج شما قبل از شروع درمان با ورزالیب® و در حین درمان تعداد گلبول‌های سفید خون شما را بررسی کند. در صورتی که هرگونه علائم و نشانه‌های تعداد پایین گلبول‌های سفید خون یا عفونت مانند تب و لرز را تجربه کردید، فوراً به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

■ **مشکلات ریوی:** مصرف ورزالیب® ممکن است باعث بروز التهابات ریوی شدید و تهدیدکننده حیات در طول درمان گردد. در صورتی که علائم اشاره شده ذیل را تجربه کردید یا این که علائم پیشین شما تشدید شده‌اند، فوراً پزشک معالج خود را مطلع کنید:

- مشکل تنفس یا تنگی نفس
- سرفه با یا بدون خلط
- درد قفسه سینه



■ مشکلات کبدی: مصرف ورزالیب® می‌تواند باعث مشکلات کبدی جدی گردد. لازم است تا پزشک معالج شما قبل از شروع درمان و در طول درمان با ورزالیب® به منظور سنجش وضعیت عملکرد کبدی آزمایشات خون شما را بررسی کند. در صورتی که هر گونه از علائم و نشانه‌های مشکلات کبدی را تجربه می‌کنید، فوراً به پزشک معالج خود اطلاع دهید:

- احساس خستگی شدید
- درد در بالا و سمت راست ناحیه معده (شکم)
- از دست دادن اشتها
- بروز خونریزی یا کبودی سریع تر نسبت به شرایط معمولی

لازم است تا آزمایش کامل خون قبل از شروع درمان با ورزالیب® و هر دو هفته یک بار در دو ماه اول درمان و به صورت ماهانه پس از دو ماه اول به صورت بالینی مورد بررسی قرار بگیرد.



VERZALIB® Side Effects

■ **لخته خون در رگ‌ها یا شریان‌های ریه:** مصرف ورزالیب® ممکن است باعث ایجاد لخته‌های خونی جدی گردد که تهدیدکننده حیات است. در صورتی که هر یک از علائم و نشانه‌های لخته خونی را تجربه می‌کنید، فوراً به پزشک معالج خود اطلاع دهید:

- درد یا تورم در بازوها و پاها
- تنگی نفس
- درد قفسه سینه
- تنفس سریع
- ضربان قلب سریع



شایع ترین عوارض جانبی مصرف ورزالیب® عبارتند از:

- تهوع
- استفراغ
- عفونت
- سردرد
- خستگی
- کاهش اشتتها
- نازک شدن یا ریزش مو (آلوبیسی)
- تعداد پایین گلbul های قرمز خون (کم خونی)
- تعداد پایین گلbul های سفید خون (لوکوپنی)
- تعداد پایین پلاکت (ترومبوسیتوپنی)
- درد شکمی

در مورد هرگونه عارضه و یا مشکلی که در طول درمان ممکن است پیش بیاید با پزشک و یا واحد مراقبت از بیماران شرکت نواوران دارویی کیمیا تماس بگیرید و به هیچ عنوان خود درمانی نکنید.





Management of Side Effects

مدیریت عوارض جانبی

در این قسمت به راهکارهایی برای مدیریت عوارض جانبی دارو می‌پردازیم. در صورتی که هرگدام از عوارض تشدید شد و بهبود نیافت به پزشک مراجعه کنید.

■ اسهال:

- در طول درمان از مایعات زیاد به منظور کاهش خطر کم آبی شدید بدن و جبران آبی که بدن تان به هنگام اسهال از دست داده، استفاده کنید.
- از مصرف آدامس و تنقلات حاوی سوربیتول خودداری کنید.
- غذاهای ساده و غذاهایی که به راحتی هضم می‌شود مصرف کنید، مانند: موز، برنج، نان تست، مایعات بدون شکر و کافئین (به غیر از چای و یا برخی آب میوه‌ها).
- مصرف پروتئین‌ها مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ پخته به کاهش اسهال کمک می‌کند.
- از مصرف غذاهایی که به طور طبیعی مسهل هستند خودداری کنید.
- همچنین مصرف مایعاتی که حاوی نمک و شکر هستند، جایگزین مناسبی برای الکترولیت‌های از دست رفته بدن در اثر اسهال هستند (مانند پودر ORS).

Management of Side Effects

■ طرز تهییه محلول ORS

در صورت عدم دسترسی به پودر بسته‌بندی شده ORS می‌توانید از دستورالعمل زیر برای تهییه آن استفاده نمائید:

- ۲ قاشق مریاخوری شکر
- ۱ قاشق چایخوری نمک
- نصف قاشق چایخوری جوش شیرین
- ۴ لیوان آب جوشیده سرد شده

تمامی مواد بالا را با هم مخلوط کنید و در پارچ بربیزید و در یخچال قرار داده تا خنک شود و سپس میل کنید.

محلول تهییه شده حداقل تا ۲۴ ساعت قابل نگهداری و استفاده می‌باشد.

■ تهوع و کم اشتهاایی:

در طول درمان ممکن است دچار تهوع و کم اشتهاایی شوید و به طور موقت تغییراتی در بو و مزه غذا احساس کنید. برای بهبود این عارضه:

- غذا را سرد یا خنک (همدماء با اتاق) مصرف کنید. بوی غذای داغ حالت تهوع شما را بدتر می‌کند.
- غذاهای بدون چاشنی، آبنبات ترش، خیارشور، نان سوخاری، بیسکویت شور و نوشیدنی‌های زنجیلی می‌توانند حالت تهوع شما را بهبود ببخشنند.
- زمانی که حالت تهوع دارید خودتان غذا درست نکنید و تا حد امکان از پخت و پز خودداری کنید و از دیگران بخواهید این کار را برای شما انجام دهند. زیرا بوی پخت و پز می‌تواند تهوع شما را بدتر کند. بنابراین سعی کنید از آشپزخانه دور بمانید.
- وقتی حالت تهوع دارید سعی کنید غذاهای مورد علاقه‌تان را بخورید.
- حجم غذایتان را کاهش و دفعات آن را افزایش دهید (۵ تا ۶ وعده در روز).
- برای اینکه مزه دهانتان عوض شود، آبنبات ترش بدون شکر بمکید یا آدامس بجویید.

Management of Side Effects

- از خوردن غذاهای چرب، سرخ شده و غذاهایی که ادویه فراوان دارند و سیستم گوارش شما را تحریک می‌کنند، خودداری کنید.
- از مصرف دخانیات (سیگار، قلیان و ...) خودداری کنید.
- دهانتان را چند بار در روز با دهانشویه مناسب شستشو دهید و حداقل دو بار در روز مسواک بزنید.
- برای کنترل تهوع، از راه دهان نفس‌های آرام و عمیق بکشید.
- تکنیک‌ها و روش‌های آرامش ذهن و ریلکسیشن را یاد بگیرید و به کار ببرید.



■ عوارض پوستی:

توصیه می‌شود در طول درمان با ورزالیب® به منظور پیشگیری و نیز مدیریت عارضه‌های پوستی نکات زیر را در نظر بگیرید:

- اگر راش (بثورات جلدی) خفیف دارید، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید. مراجعه و بررسی هرچه سریعتر بثورات جلدی به رفع سریعتر عارضه کمک می‌کند.
- از قرارگرفتن در معرض نور خورشید خودداری کنید.
- از ضدآفتاب مناسب برای پوست خود استفاده کنید. ضدآفتاب‌های با SPF ۳۰ و بالاتر پیشنهاد می‌شوند.
- از شوینده‌های قوی و نیز آب داغ برای شستشوی پوست استفاده نکنید.
- محصولات ضد جوش، پوست شما را خشک می‌کنند. از استفاده آن‌ها خودداری کنید.
- پوست خود را همواره مرطوب نگهدارید.





Management of Side Effects

■ عفونت:

هنگامی که به عفونت مبتلا شوید پزشک شما معمولاً از انواع آنتیبیوتیک‌ها با دوزهای مختلف برای کنترل علائم شما استفاده می‌کند. به طور معمول برای جلوگیری از برخی عفونت‌ها از واکسیناسیون استفاده می‌شود اما باید تحت نظارت و تجویز پزشکتان باشد.

■ نوترودپنی:

نوترودپنی باعث کاهش ایمنی بدن در مقابل ابتلا به عفونت‌ها از جمله عفونت‌های ناشی از غذاها و مسمومیت‌های غذایی می‌شود. بنابراین باید در مورد بهداشت غذایی خود دقیق باشید:

- فقط از آب شیر و بطری‌های آب آشامیدنی برای آشامیدن و پخت و پز استفاده کنید.
- فقط از شیر، پنیر و بستنی پاستوریزه استفاده کنید. این مورد شامل همه انواع شیرگاوی، بز، گوسفند و حتی شیر سویا می‌باشد.
- استفاده از ماست پروبیوتیک و به طور کلی نوشیدنی‌های پروبیوتیک توصیه نمی‌شود.
- عسل به طور طبیعی حاوی مخمر و باکتری‌های سازنده اسپوراست. علیرغم خاصیت ضدباکتریایی عسل توصیه می‌شود در طول درمان از عسل خام، شانه عسل تازه و عسل غیر تصفیه شده استفاده نکنید. عسل پاستوریزه‌ای که ذرات گرد و غبار آن تصفیه شده مناسب‌تر است.

- آجیل و میوه خشک شده تنها زمانی که تحت گرما قرار گیرند و باکتری های آنها از بین برود برای مصرف مناسب هستند.
- در صورت امکان از گرم کردن مجدد مواد خودداری کنید و هر ماده غذایی را که در یخچال نگهداری می کنید با فویل پوشانده و حداکثر به مدت ۲۴ ساعت ذخیره کنید و مواد غذایی منجمد را پس از بخ زدایی مجددا منجمد نکنید.

■ خستگی و ضعف:

خستگی یکی از رایج ترین علائم بیماری و نیز عوارض جانبی درمان سرطان است. احساس خستگی و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت است. با این حال بیشتر افراد درجه ای از خستگی را تجربه می کنند. این عرضه بر کیفیت زندگی شما تاثیر می گذارد و ممکن است سطح انرژی شما را بسیار پایین بیاورد، در حدی که به سختی بتوانید فعالیت های روزمره و عادی خود را انجام دهید.

هیچ قانونی که به شما زمان دقیق بهبودی این عرضه را بگوید وجود ندارد اما خبر خوب این است که در بیشتر مواقع گذر زمان و کنترل کردن سطح سلول های خونی، شما را به سطح انرژی اولیه تان برمی گرداند.

Management of Side Effects

در صورتی که احساس اضطراب و غم و اندوه شما بیش از حد شد و منجر به پریشانی و کم خلقی شما شد، از روان‌شناسان کمک بگیرید.

نکاتی که به مدیریت احساس خستگی شما کمک می‌کند:

بپذیرید که انرژی شما اکنون به اندازه سابق نیست. بنابراین فعالیت‌هایی که انرژی شما را بیشتر مصرف می‌کنند، مشخص کرده و توجه بیشتری به آنها داشته باشید. همچنین فعالیت‌هایی که سطح انرژی شما را بالا می‌برند مشخص کنید، منظور از این فعالیت‌ها صرفا استراحت و خواب نیست. بیشتر اوقات فعالیت‌های جسمی مانند پیاده روی یا یوگای سبک می‌توانند سطح انرژی شما را بالا ببرند. مشخص کنید چه ساعتی از روز انرژی شما بیشتر است تا از این ساعات استفاده بهینه را ببرید. کارهایی را که قرار است انجام دهید اولویت‌بندی کنید و تصمیم بگیرید که آیا همه آنها لازم است در یک روز انجام شوند یا خیر. سطح انرژی شما متغیر است و بعضی از روزها ممکن است احساس خستگی کمتر و انرژی بیشتری داشته باشید. توصیه می‌شود حتی در این روزها نیز از اضافه کاری خودداری کنید. رعایت نکاتی که در مبحث تغذیه ذکر می‌شود نیز در کاهش این عارضه تاثیر دارد.



Management of Side Effects

■ درد:

در طول درمان ممکن است، دردهایی مانند استخوان درد و درد مفاصل داشته باشید. درد مزمن، ممکن است همراه با کاهش اشتها، خستگی، حالت تهوع و احساس بیقراری باشد. بیشتر اوقات دردها با مصرف مسکن کاهش می‌یابند اما روش‌های دیگری نیز برای کاهش درد وجود دارد از جمله: درمان‌های مکمل، مداخلات روانشناختی مانند روان‌درمانی و همچنین کاردرومی. در موارد شدید که قادر به تحمل درد نبودید، حتماً از پزشک خود کمک بگیرید.



تغذیه در طول درمان:

در طول درمان با ورزالیب[®] لازم نیست از رژیم غذایی خاصی استفاده کنید و تنها کافی است رژیم غذایی خود را متعادل نگهدارید (مگر در شرایط ویژه و با راهنمایی متخصص تغذیه). رژیم غذایی متعادل به گونه‌ای است که هر روز باید نسبت خاصی از همه گروه‌های غذایی (شامل کربوهیدرات‌ها، میوه و سبزیجات، پروتئین، لبیات، و چربی) را مصرف کنید.

Nutrition During Treatment



Nutrition During Treatment

نکات کلی

- مصرف میوه و سبزیجات تازه (مخصوصا سبزیجات برگ سبز) توصیه می شود.
 - از مصرف نوشیدنی های الکلی اجتناب کنید.
 - مصرف غذاهای ترد، شور، بسیار تند، اسیدی یا گرم ممکن است عوارضی مانند زخم و درد دهانی شما را تشدید کند. بنابراین از مصرف آنها خودداری کنید. همچنین سیگارکشیدن و نوشیدن الکل می تواند التهاب دهان را بدتر کند.
 - مصرف نوشیدنی های شیرین و موادغذایی حاوی قند را کاهش دهید.
- قبل از ایجاد هر گونه تغییر در رژیم غذایی یا برنامه ورزشی خود، با پزشک خود مشورت کنید.



A photograph of a smiling senior couple jogging outdoors. The man on the left is wearing a grey t-shirt and has white hair. The woman on the right is wearing a yellow t-shirt and blue pants. They are both smiling and looking towards each other.

توجه داشته باشید اگر عوارض جانبی را تجربه کردید، به این نکات بسنده نکرده و آن را در اسرع وقت با مشاوران ما در واحد مراقبت از بیماران شرکت نوآوران دارویی کیمیا و یا پزشک معالج خود در میان بگذارید تا بتوانیم به شما در مدیریت آن کمک کنیم.

I'm living longer



Self Examination

خودآزمایی پستان:

معاینه ماهیانه توسط خود شخص به صورت نگاه کردن به پستان‌ها مقابل آینه و لمس کردن آنها با دست.

■ نگاه کردن به پستان‌ها مقابل آینه:

در حالت‌های زیر ایستاده و پستان‌های خود را مشاهده کنید:

- دست‌ها را در دو طرف بدن به حالت آویزان قرار دهید.
- دست‌ها را در دو طرف سر به صورت صاف بالا ببرید.
- کف دست‌ها را پشت سر به هم قفل کرده و شانه‌ها را عقب بکشید.
- دست‌ها را به روی کمر فشار داده و شانه‌ها را به عقب بکشید.
- خم شوید و دست‌ها را به صورت آویزان در دو طرف تنه قرار دهید.

■ لمس کردن کامل پستان‌ها:

- برای لمس پستان ابتدا به پشت دراز بکشید.
- یک بالش کوچک در زیر شانه چپ گذاشته و دست چپ خود را زیر سر قرار دهید.
- برای لمس پستان چپ از دست راست استفاده کنید و در مورد پستان راست بالعکس.
- برای معاينه با توجه به اينكه نرمه انگشتان از حساسیت بالايی برخوردار است از بند دوم و سوم استفاده کنید.
- از قسمت بالاي پستان تا پایین پستان را معاينه کنید. برای اين کار می‌توان از اطراف پستان به طرف نوک پستان در دایره‌های فرضی هم جهت عقربه‌های ساعت لمس را انجام داد تا بتوان هنگام توضیح به پزشک محل دقیق ضایعه را مشخص نمود.
- با هر دستی باید سینه مقابله معاينه شود. بدین منظور از کف چهار انگشت استفاده شود.

Self Examination

- همچنین تعیین فاصله ضایعه از مرکز یا نوک سینه باید به طور دقیق به پزشک گزارش شود.
- پس از لمس هر پستان لمس زیر بغل همان طرف را نیز انجام دهید.
- از انگشت شست برای معاینه استفاده نشود؛ زیرا زمانی که سینه بین چهار انگشت و شست گرفته شود، خود غدد طبیعی شیری که به طور طبیعی در هر خانمی وجود دارد ممکن است با ضایعه اشتباه گرفته شود.
- در انتهای معاینه پستان‌ها را در جهات مختلف مانند حالت دوشیدن فشار دهید و به ترشحات نوک پستان توجه کنید. ترشحات نوک پستان شایع هستند و اگر از هر دو طرف پستان باشند معمولاً خطری ندارند. این در حالی است که ترشحات خون‌آبهای یک طرفه مهمتر هستند.

فهرست واژگان تخصصی

بیوپسی: نمونه برداری یا تکه برداری از بافت‌ها به منظور بررسی بیشتر.

تست‌های ژنومیک: فرآیند مشاهده کل ژنوم یک موجود زنده.

بیومارکر: یک نشانگر زیستی که شاخصی برای تشخیص و یا شدت بیماری است.

تومور سرطانی خوش‌خیم: به این معنی است که تومور می‌تواند رشد کند اما گسترش نمی‌یابد.

DNA: دی‌ان‌ای تمام کدها و اطلاعات ژنتیکی جانوران، گیاهان و حتی ویروس‌ها را حمل می‌کند که این اطلاعات برای رشد، تکامل، بقا، تولید مثل و سایر عملکردهای موجودات، حیاتی است.

ژن: ژن قطعه‌ای از مولکول DNA است که اطلاعات ژنتیکی با خود حمل می‌کند و از والدین به نسل بعد انتقال می‌دهد.

ژنوم: تمام ژن‌هایی که یک ارگانیسم را می‌سازند.

Medical Terminology

لوبول: هر سینه دارای تعدادی بخش (لوبول) است که از نوک پستان منشعب می‌شود.

متاستاز: گسترش و مهاجرت سلول‌های سرطانی از یک بافت به بافت دیگر.

ماموگرافی: ماموگرافی یک روش تصویربرداری با اشعه ایکس است که برای بررسی پستان برای تشخیص زودهنگام سرطان و سایر بیماری‌های پستان استفاده می‌شود.

اختصارات:

MRI: Magnetic Resonance Imaging

DNA: Deoxyribonucleic acid

: منابع

- cancer.org
- cancer.net
- cancer.gov
- www.kimia-pharma.co/fa
- https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/208716s010s011lbl.pdf

یادداشت

از این فضای برای نوشتمن سوالاتی که می خواهید از پزشک و یا مشاوران شرکت نوآوران دارویی کیمیا بپرسید، یادآوری های مصرف دارو و سایر نکات مفید در طول درمان استفاده کنید.



پادداشت

Once you choose **hope**
every thing's possible

زیرا مراقب سلامتی تان هستیم...

Because We Care for Your Health...



راه های ارتباطی با بخش مراقبت از بیماران شرکت
نوآوران دارویی کیمیا (پاسخگویی ۲۴ ساعته)



۰۲۱ - ۶۶۴۳۵۷۸۹

۰۹۰۲ ۱۹۸۳۳۷۵